

Actualités du jardin bio

Lycée agricole et horticole de Coutances

☞ 28 mars 2011



Après deux désherbages et des températures plus clémentes, les carottes de variété Napoli F1 se développent sous le voile thermique P17 à l'abri du tunnel.

Toujours sous tunnel, nous avons mis en place cette année une **pépinière de poireaux**, variété Azur. Le semis a été fait le 18 février au semoir manuel (5 lignes espacées de 25 cm) puis recouvert également d'un P17. La levée a eu lieu après 3 semaines et nous avons mis le voile sur arceaux de tunnel nantais.

L'**objectif** est de produire sur cette pépinière de 40m² **5000 plants** qui seront repiqués fin juin. Avec l'achat de 5000 autres, ce seront 10000 plants qui seront mis en place sur 500 m².

Après travail du sol au canadien puis au rotavator, des bâches biodégradables ont été déroulées sur **160 m pour accueillir bulbes d'échalotes (30 kg, variété Longor) et bulbilles d'oignons (25 kg soit environ 11000 bulbilles, variété Sturon)**. Les échalotes ont été plantées mi-mars et les ³/₄ des oignons jaunes la semaine passée. Reste à surveiller l'émergence des feuilles (pour éviter qu'elles ne partent sous la bâche), à désherber les allées (à défaut de paille cette année) et un peu les trous de plantation, pour une récolte fin juillet.



Des oignons blancs semés en pépinière en janvier ont également pris place sur une partie des bâches.



Nous avons commencé à épandre l'amendement organique. C'est le **fumier de la ferme composté**. Le compostage a été partiel du fait d'un seul retournement du tas et l'épandage à la fourche s'est révélé difficile par l'humidité importante du fumier. L'épandage se fait à la dose de 20t/ha avant les cultures exigeant une bonne fumure (pommes de terre, cucurbitacées, poireaux, choux).



En ce qui concerne les petits fruits, une partie des fraises remontantes (Mara des bois) a été couverte d'un **tunnel nantais** pour **hâter** leur production et on voit apparaître les **boutons floraux** des cassissiers, groseilliers et framboisiers.

En pépinière, les **semis de solanacées** (tomates, aubergines et poivrons) ont été réalisés **en terrines mi-février** et les tomates ont été repiquées la semaine dernières en godets. Début mars, courgettes et concombres ont été semés en godets en vue d'une implantation en avril sous abri.

En plein champ, les premiers semis ont concerné les **fabacées** (fèves, pois mangetouts, petit pois), les **épinards** et les **radis**. Ils ont été recouverts d'un voile micro-climat. 4 rangs de **pommes de terre** variété Amandine ont été également plantés et recouverts d'un P17 doublé pour avoir une petite production primeur mi-juin.

C'est la fin des récoltes en plein champ : les derniers poireaux sont petits, les navets montent et deviennent fibreux, les carottes durcissent et se dessèchent quelque peu. Pour le maraîcher, c'est le **début d'une période creuse en terme de production** et donc de ventes. Mais pas en terme de travail : il faut tout mettre en place...

Christophe

